

DESCRIPTIONS D'ARACHNIDES NOUVEAUX
DE LA FAMILLE DES *THOMISIDÆ*
par E. Simon.

1. **Stiphropus dentifrons** sp. nov. — ♀ long. 8 mm. — Cephalothorax niger, nitidus, valde punctato-impressus, antice haud attenuatus, fronte latissima, clypeo utrinque, ad angulum, dente subacuto infra directo, instructo. Oculi medii a lateralibus quam inter se remotiores, aream paulo latiore quam longiorem et antice quam postice angustiore occupantes. Abdomen atrotestaceum, impressionibus maximis, rotundis et subcontiguïs supra munitum. Pedes nigro-picei, coxis cunctis, metatarsis tarsisque posticis dilutioribus et ferrugineis. — Africa occid. : Gabon.

2. **Tagulis mystacina** sp. nov. — ♀ long. 3 mm. — Cephalothorax niger, valde coriaceo-granulosus, ad marginem posticum setis validissimis fulvis elevatis uniseriatis et antice, prope oculos laterales, setis longissimis trinis, depresso-lanceolatis, insigniter munitus. Area oculorum mediorum antice quam postice latior. Abdomen atrum, pilis crassis albidis conspersum, macula media transversa et saepe lineolis sinuosis et interruptis albis decoratum, subtus nigricans. Sternum, chelaeque nigra. Pedes quatuor antiqui nigro-castanei, tibiis, prope basin, anguste et oblique alboannulatis. Pedes postici pallide fusci, femoribus ad basin late luteis, reliquis articulis luteo-lineatis. — Ins. Taprobane!

3. **Zametopias Trimeni** sp. nov. — ♀ long. 4,5 mm. — Cephalothorax piceo-rufescens, subtiliter coriaceus, granulis parvis cancellatus et setis validis paucis munitus. Abdomen breve, longe et parce hirsutum, supra nigricans, vitta media lata dilutiore confusa et, prope medium, utrinque macula albida ornatum, subtus obscure testaceum. Chelae, partes oris sternumque picea, laevia. Pedes luridi, coxis trochanteribus femoribusque 1ⁱ paris valde infuscatis. — Prom. Bona Spei!

4. **Phaenopoma (Nesis) plana** sp. nov. — ♀ (*pullus*) long. 3 mm. — Cephalothorax fulvo-rufescens, laevis et nitidus, regione oculorum albida. Abdomen albidum, depressum, longius quam latius, antice obtuse truncatum et emarginatum, postice obtusum. Chelae, partes oris, sternum pedesque lurida, pedibus quatuor anticis infuscatis et ferrugineis. Tibiae anticae subtus aculeis longissimis pronis 5-5 munitae sed aculeis lateralibus carentes. Metatarsi aculeis similibus inferioribus 5-5 aculeisque lateralibus minoribus binis muniti. — Africa occid. : Sierra Leone.

5. **Lycopus trabeatus** sp. nov. — ♀ long. 7 mm. — Cephalothorax laevis, fulvus, regione frontali leviter rufulo-tincta, tuberculis oculorum cinereo-albidis. Abdomen oblongum, luteum, punctis rufulis, in medio densioribus et vittam latam confusam designantibus, supra ornatum. Sternum, partes oris pedesque fulvo-olivacea. — ♂ long. 4,5 mm. — Cephalothorax subtilissime coriaceus, fulvo-olivaceus, tenuissime nigricanti-marginatus, area oculorum rufo-castanea. Area oculorum mediorum non multo longior quam latior. Abdomen angustum, subparallelum, pallide roseum, parce setosum et inordinate rufulo-punctatum, sternum, partes oris pedesque fulvo-olivacea, tibiis anticis ad apicem, metatarsis tarsisque fusco-castaneis, posticis leviter roseo-tinctis, aculeis fuscis subpellucetibus, longis et numerosis armatis. Pedes-maxillares sat breves, luridi, apophysi tibiali apice lamellosa, oblique truncata cum angulis leviter productis. — India merid. : Madura, Trichinopoly, montes Kodeikanel.

6. **Dietopsis castaneifrons** sp. nov. — ♂ long. 4,3 mm. — Cephalothorax subtilissime coriaceus, pallide luridus, regione oculorum, clypeo chelisque fusco-castaneis. Area oculorum mediorum multo longior quam latior. Abdomen angustum, parallelum, pallide roseo-testaceum, parcissime nigro-setosum et maculis rufulis parvis biseriatis (3-3 vel 4-4) ornatum. Sternum pedesque pallide lurida, tibiis posticis et partes oris leviter rufulo-tinctis. Pedes longi, aculeis pellucetibus numerosis et longissimis armati. Pedes-maxillares breves, luridi, femore intus, tibia tarsoque rufulo-tinctis; patella vix longiore quam latiore, tibia patella paulo brevior, subquadrata, extus mutica, sed subtus apophysi magna, antice directa, paululum lanceolata, intus excavata et marginata munita; tarso breviter ovato; bulbo simpliciter disciformi. — India merid. : montes Kodeikanel.

7. **Pherecydes livens** sp. nov. — ♀ long. 5 mm. — Cephalothorax coriaceus et parce rugosus, nigricans, breviter albo-pubescent, parte thoracica lineis binis postice convergentibus, clypeo vitta media, albidis, ornatus. Abdomen supra olivaceum, valde nigricanti-variaturum, subtus albidum sed vitta media lata nigra ornatum. Sternum nigrum, laeve. Pedes luridi, femoribus supra nigro-punctatis, patellis, tibiis, metatarsisque apice late nigro-variatis et subannulatis, tibiis metatarsisque anticis subtus aculeis biseriatis paucis parvis munitis, sed aculeis lateralibus carentibus. — Tunisia merid. : Tozzer.

8. **Smodicinus coroniger** sp. nov. — ♀ long. 3 mm. — Cephalothorax nigricans, coriaceus, utrinque, ad marginem, minute fulvo-trimaculatus, supra tuberculis thoracicis et oculo-

rum leviter dilutioribus et ferrugineis. Abdomen breviter oblongum, nigrum, supra antice linea longitudinali abbreviata et, prope medium, utrinque linea transversa, subtus utrinque macula majore albidis, decoratum. Sternum fuscum. Pedes lutei, femoribus anticis fere usque ad basin, posticis ad apicem nigris, patellis tibiisque anticis nigris (tibiis annulo subbasilari luteo ornatis) posticis tenuiter nigro-lineatis. — Africa occid. : Sierra Leone.

9. **Lysiteles catulus** sp. nov. — ♀ long 3,7 mm. — Cephalothorax laevis, parce et longe setosus, fulvo-rufescens, tuberculis oculorum lateralium albidis, parte thoracica nigro-marginata et supra vittis duabus fuscis, postice convergentibus, ampliatis et sinuosis, notata. Abdomen breviter ovatum, fulvum, antice et utrinque albo-punctatum, supra vittis duabus fuscis vel nigris, saepe interruptis, extus ramula tria obliqua emittentibus ornatum, subtus fusco nigrove marginatum. Sternum luridum, fuscolimbatum. Chelae nigrae. Pedes pallide luridi, antici leviter obscuriores et femoribus subtus fusco-vittatis. — India merid. : Trichinopoly, montes Kodeikanel.

10. **Amyciæa hesperia** sp. nov. — ♂♀ long. 5-6 mm. — Cephalothorax obscure fulvo-rufescens, postice tenuissime nigro-marginatus. Abdomen augustum et longum, postice leviter ampliatum, prope medium leviter constrictum, fulvum, supra confuse infuscatum et minute albo-punctatum, in parte apicali transversim fusco-striatum et maculis nigricantibus transversis binis ornatum. Pedes quatuor antici fulvo-rufescentes, femoribus extus tibiis subtus fusco-lineatis, tarsis apiceque metatarsorum albidis. Pedes quatuor postici luridi. — Ab *A. forticipi* Cambr., cui valde affinis est imprimis differt area oculorum mediorum evidentius longiore quam latiore et antice quam postice vix angustiore, pedum-maxillarium maris tibia apophysibus binis : altera exteriori lata, brevi et antice uncata, altera inferiore longa, recta et gracili sed obtusa, tarso multo latiore sed processu exteriori multo minore, obtuso et setigero ab apophysi tibiali longe remoto. — Africa occid. : Sierra-Leone.

11. **Talaus limbatus** sp. nov. — ♂ (*pullus*) long. 2,5 mm. — Cephalothorax fusco-piceus, clypeo in medio paulo dilutiore. Abdomen subrotundum, supra nigrum, antice vitta lata recurva alba marginatum, postice macula maxima trapeziformi albida decoratum, subtus albido-testaceum utrinque fuscum. Chelae sternumque fusca. Pedes breves, omnino flavi. — Transvaal : Makapan !

12. **Pactactes trimaculatus** sp. nov. — ♂ long. 2,6 mm. —

Cephalothorax niger, nitidus. Abdomen breviter ovatum, nigrum, macula anteriore parva triquetra et prope medium, utrinque, macula transversa, albo-opacis, decoratum. Sternum rufescens. Chelae nigrae. Pedes fulvi, femoribus anticis fere usque ad basin, posticis ad apicem brunneis, metatarsis tarsisque anticis infuscatis. Pedes-maxillares castanei, patella nodosa, tibia patella vix brevior, latiore, apophysi exteriori maxima, supra ampliata et rotunda, extus late depressa, subtus ad angulum dentata, instructa. — Africa orient. : Zanguebar.

13. **Pactactes obesus** sp. nov. — ♀ long. 5 mm. — Cephalothorax nitidissimus, niger, ad marginem leviter dilutior et ferrugineus. Abdomen breve, subglobosum, supra albidum, macula nigra maxima utrinque profunde dentata et foliiformi (fere ut in *Synaemate globoso*) ornatum. Sternum chelaeque nigra. Pedes nigricantes, patellis basique tibiis ferrugineis, femoribus quatuor posticis ad basin luteis. — Africa occid. : Ogoue.

14. **Holopelus Malati** sp. nov. — ♀ long. 3,5 mm. — Cephalothorax tenuiter coriaceo-granulosus, setis albis parvis et clavatis conspersus, obscure rufescens, regione frontali late infuscata, supra vittis duabus postice evanescentibus et utrinque vitta marginali latiore fulvis ornatus. Abdomen subrotundum, parce et breviter albo-setosum, fulvo-testaceum, leviter fusco-variatus et prope medium vitta transversa arcuato-sinuosa nigra ornatus. Sternum, venter pedesque luridi, breviter albido-pilosi, femoribus, basi excepto, nigricantibus, tibiis metatarsisque subtus valde infuscatis, metatarsis tarsisque circiter æquilongis. — India merid. : Trichinopoly.

15. **H. albibarbis** sp. nov. — ♀ long. 3 mm. — Cephalothorax coriaceo-granulosus, pilis crassis pronis, supra albidis, in clypeo niveis, vestitus, fulvo-rufescens, vitta media, vittisque lateralibus latis fuscis confusis et supra lineolis binis dilutioribus postice convergentibus, notatus. Abdomen subrotundum, pallide testaceum, punctis parvis nigris, postice lineas transversas designantibus et pilis brevibus albidis seriatis, ornatus, subtus vitta lata nigricanti notatus. Sternum nigrum, testaceo-variatus. Pedes luridi, femoribus, patellis tibiisque valde fusco-variatis. — Prom. Bona Spei!

16. **Thomisops bullatus** sp. nov. — ♀ long. 3,5 mm. — Cephalothorax brevis, subtiliter coriaceus, utrinque, ad angulum posteriorem, tuberculo parvo truncato munitus, luteus, antice posticeque late dilutior et supra lineolis flexuosis dilutioribus notatus. Abdomen latius quam longius, antice late truncatum, postice rotundum, supra planum, duriusculum, albidum, crebre

et minute albo-pustulosum, utrinque et postice profunde plicatum, interdum ad marginem roseo-tinctum. Chelae, sternum, pedesque lutea, femoribus supra ad apicem saepe fusco-notatis. — ♂ long. 2,3 mm. — Cephalothorax rufescens, postice ad marginem nigro-reticulatus atque ad apicem tenuiter nigro-lineatus. Abdomen luteum, minute pustulosum, anguste albo-limbato, minute et parce nigro-punctatum. Pedes luridi, femoribus infuscatiss et subvittatis. Pedes-maxillares fere *Th. pusionis* sed tarso multo majore — Africa aust. : Bechuanaland, Transvaal !

17. **T. sulcatus** sp. nov. — ♀ long. 4 mm. — Cephalothorax brevis, coriaceus et valde granulatus, antice sulco longitudinali impressus, niger, regione frontali et clypei dilutius rufescens sed fusco-variegata, supra vittis duabus fulvis, intus rectis extus valde ramosis, ornatus. Abdomen latius quam longius, antice late truncatum, supra deplanatum, duriusculum, obscure fulvum et confuse fusco-plagiatum, minute et sat crebre fulvo fuscoque pustulosum. Chelae rufescentes, antice fusco-variatae. Sternum nigrum. Pedes nigri, femoribus cunctis ad basin late luteo-annulatis, posticis ad basin atque ad apicem annulatis, metatarsis tarsisque fusco-rufescentibus. — Transvaal : Pretoria, Makapan !

18. **Camaricus nigrotessellatus** sp. nov. — ♀ long. 10 mm. — Cephalothorax nitidus, laete rufo-castaneus, utrinque macula nigra transversa, oculos laterales et medios includente, notatus. Abdomen late oblongum, depressiusculum, supra pallide luteum, maculis nigerrimis maximis sex transversis, anticis reliquis majoribus et vitta longitudinali lutea sectis, ornatum, subtus rufolividum, nigro-marginatum. Chelae, partes oris sternumque rufescentia. Pedes pallide luridi, coxis trochanteribusque nigris, reliquis articulis, tarsis exceptis, nigro-lineatis et apice anguste nigro-cinctis. — Africa orient : Tonga.

19. **Cynathea obliterated** sp. nov. — ♀ long. 7 mm. — Cephalothorax laevis, fulvo-rufescens, tenuiter nigro-marginatus et utrinque macula frontali angulari nigra notatus. Abdomen antice obtuse truncatum, postice ampliatus et rotundum, punctis coriaceis foveolatis, anticis parvis, posticis longis et sulciformibus impressum, albidum, supra maculis binis longitudinalibus incurvis et utrinque vitta marginali pallide fuscis ornatum. Chelae, partes oris, sternum, pedesque pallide lurida, femoribus quatuor anticis nigro-olivaceis, tibiis anticis subtus, metatarsis cunctis supra nigro-lineatis, tibiis anticis, aculeis binis apicalibus exceptis, muticis, metatarsis aculeis sat brevibus 2-2 subtus instructis. — Africa occid. : Gabon.

20. **C. bicolor** sp. nov. — ♀ (*pullus*) long. 4 mm. — Cephalothorax, sternum et partes oris nigerrima. Abdomen nigerrimum, lineis plurimis albo-opacis, plus minus interruptis, limbatum, subtus albo-marginatum. Pedes pallide luridi, tibiis, subtus, patellis utrinque, metatarsis tarsisque supra, nigro-lineatis. — Senegal (Chevreux).

21. **Runcinia plana** sp. nov. — Long. 5 mm. — Lutea, cephalothorace tenuissime nigro-marginato, tuberibus ocularibus utrinque albis, abdomine granulis rufulis consperso. Cephalothorax longior quam latior, planissimus. Abdomen planum, plus triplo longius quam latius, antice truncatum, postice obtusum. Tibiae anticae aculeis biseriatis 4-2 (iniquis 1° et 3° seriei sup. reliquis majoribus), metatarsis aculeis iniquis 5-5, subtus instructis. — Paraguay.

22. **Runciniopsis bifrons** sp. nov. — ♀ long. 6 mm. — A *R. flavida* E. S., cui valde affinis et subsimilis est, tantum differt, cephalothorace paulo latiore, minus distincte albo-lineato, aculeis tibiarum et metatarsorum anticorum brevioribus. — Ins. Taprobane mont.; Sikkim.

23. **Massuria javana** sp. nov. — ♀ long. 5 mm. — Cephalothorax fulvo-viridis, subtiliter coriaceus, parce et brevissime albido-pilosus, postice confuse fusco-bimaculatus, regione oculorum transversim albida. Abdomen fuscum, confuse albido-marginatum. Pedes pallide fulvo-virides, parcissime fusco-punctati, tibiis anticis subtus aculeis parvis biseriatis 4-5, basin haud attingentibus, metatarsis aculeis validioribus sed brevibus 5-6 subtus instructis. — Ins. Java, mont.

24. **Platyarachne scopulifera** sp. nov. — ♀ long. 4 mm. — Pallide lurida, cephalothorace subtiliter coriaceo, area oculari alba, linea exili fusca antice limitata, abdomine albo-opaco, punctis impressis mediis binis flavidis notato, tibiis quatuor anticis annulo apicali nigerrimo ornatis, metatarsis tarsisque apice fulvo-annulatis, femoribus tibiisque anticis subtus setis rigidis crebre vestitis. — Peruvia orient. : Tarapoto (de Mathan).

25. **P. histrio** sp. nov. — ♂ long. 2,8 mm. — Cephalothorax luridus, subtiliter coriaceus, utrinque vittis transversis nigerimis quatuor, radiantibus et abbreviatis, ornatus, area oculorum alba antice posticeque linea exili fusca discreta, angulis clypei nigris. Abdomen albidum. Pedum femora nigra annulo subbasilari lato et sinuoso annuloque apicali parvo luridis ornata, patellae nigrae. Tibiae metatarsi tarsisque rufo-castanei, ad basin anguste lutei. Pedes-maxillares lutei, femore fusco, tarso rufo-castaneo, tibia apophysibus binis, superiore obliqua et subacuta,

altera minore et truncata, extus armata, tarso lato supra spinuloso. — Brasilia : Rio.

26. **Heriæus transvaalicus** sp. nov. — ♀ long. 4,5 mm. — Pallide viridis, longe albo-crinitus, cephalothorace supra lineis binis albidis ornato et saepe regione oculari rufescenti-tincta, abdomine antice vitta media abbreviata et utrinque lineolis plurimis arcuatis albidis notato. — Ab *H. hirsuto* Walck., cui valde affinis est, differt cephalothorace vitta media alba carente, area oculorum mediorum brevior, non multo longiore quam antice latiore, plagula vulvae fusca, paulo longiore quam latiore, leviter depressa, antice foveola transversa sulciformi, tenuiter marginata, limitata. — Transvaal : Makapan !

27. **Firmicus multipunctatus** sp. nov. — ♀ long. 7 mm. — Cephalothorax multo longior quam latior, valde depressus, planus, subtiliter coriaceus, fulvo-rufescens, tuberculis ocularibus albidis. Abdomen longum, subparallelum, depressum, pallide luteum, antice minute et inordinate nigro-punctatum, dein punctis majoribus elongatis biseriatis (utrinque quatuor) supra ornatum. Chelae, sternum, pedesque fulvo-rufescentia, pedes quatuor antici reliquis paulo obscuriores et multo robustiores, femoribus subclavatis, tibiis aculeis robustis 4-5, metatarsis aculeis similibus 5-5 subtus armatis sed aculeis lateralibus carentibus. Pedes postici omnino mutici. — Arabia merid. : Aden !

28. **Firmicus bivittatus** sp. nov. — ♂ long. 7 mm. — Cephalothorax nigerrimus, subtiliter coriaceus. Abdomen anguste oblongum, supra albo-opacum, vittis duabus nigris parallelis ornatum, subtus atrum, lineolis albis binis abbreviatis notatum. Chelae, sternum et partes oris nigerrima. Pedes quatuor antici nigri, metatarsis tarsisque luteis, pedes quatuor postici lutei, tibiis metatarsis tarsisque anticis intus longe et tenuiter pilosis. — Algeria sept. : Edough !

29. **Physoplatys nitidus** sp. nov. — ♀ (*pullus*) long. 4 mm. — Cephalothorax nitidus, flavo-luridus, linea marginali nigra exillima atque in medio punctis rufulis paucis et inordinatis notatus, tuberculis oculorum albidis. Abdomen planum, non multo longius quam latius, antice obtuse truncatum, postice sensim ampliatum et rotundum, pallide flavum, punctis nigris paucis, in series transversas ordinatis, parce ornatum. Sternum, partes oris pedesque lurida, femoribus anticis rufulo-punctatis, patellis tibiis metatarsisque quatuor anticis ad apicem rufulo-cinctis, tibiis aculeis mediocribus 3-3 (interioribus longioribus), metatarsis aculeis iniquis 5-6 subtus instructis. Pedes postici mutici, brevissimi, tarsis metatarsis haud brevioribus. — Paraguay (Germain).

30. **Tharrhalea bicornis** sp. nov. — ♀ long. 5,5 mm. — Cephalothorax luridus, vitta media lata dilutior et utrinque lineolis radiantibus flexuosis numerosis fuscis, notatus, fronte utrinque, ad angulos, tuberculo acuto et erecto munita. Oculi postici in lineam valde recurvam, medii a lateralibus quam inter se fere duplo remotiores. Clypeus angustus. Abdomen breve, antice rotundum, postice valde ampliatus et truncatus, fulvo-cinereum, maculis parvis albis fusco-limbatis conspersum, postice, in declivitate, linea fusca transversa accentiformi ornatus. Pedes luridi, fulvo fuscoque variati, tibiis metatarsisque anticis aculeis inferioribus longis et numerosis, aculeisque lateralibus minoribus, utrinque biserialis, munitis. — Ins. Luzon : Antipolo !

31. **T. semiargentea** sp. nov. — ♀ long. 5 mm. — Cephalothorax sublaevis, fulvo-rufescens, tuberculis ocularibus albidis. Abdomen longius quam latius, postice ampliatus et rotundus, fulvus, late albo-argenteo-marginatus, area dorsali fulva, utrinque infuscata. Chelae, sternum, pedesque pallide fulvi. Pedes quatuor antici longi et graciles, tibiis metatarsisque aculeis gracilibus inferioribus et lateralibus munitis. — Madag. : Tamatave (Camboué).

32. **Hedana octoperlata** sp. nov. — ♀ long. 5 mill. — Cephalothorax fulvo-aurantiacus, vitta media lata dilutior notatus. Oculi quatuor postici inter se subaequales et fere aequidistantes. Abdomen sat longe oblongum, postice attenuatum, luteum, maculis rotundis leviter convexis rufulis octo, biserialiter ordinatis supra ornatus. Sternum pedesque lutei, patellis, tibiis metatarsisque anticis late rufulo-annulatis. Aculeis ordinariis. — Venezuela : Caracas !

33. **Erissus validus** sp. nov. — ♀ long. 13 mm. — Cephalothorax fusco-rufescens, macula media magna V formante, utrinque, prope oculos, lineis binis obliquis, atque ad marginem maculis parvis, obscure testaceis, ornatus, pilis fulvo-nitidis vestitus. Clypeus area oculorum latior. Abdomen subglobosum, flavescenti-testaceum, macula obscura, sinuosa, magna, postice valde ampliata supra notatum, subtus, in medio, leviter infuscatus. Sternum pedesque fulvi, hi fusco-annulati, aculeis ordinariis instructi. — Brasilia : le Para.

34. **Erissus truncatifrons** sp. nov. — ♀ long. 7,2 mm. — Cephalothorax fuscus, vitta lata fulvo-rufescenti in medio leviter constricta, notatus, in lateribus pilis flavo-nitidis in medio pilis albo-argenteis parce vestitus. Oculorum linea postica latior et magis recurva quam in praecedenti, oculi inter se subaequales et aequae distantes. Clypeus angustior et verticalis. Abdomen paulo

latius quam longius, postice late rotundum, pallide flavum, pilis brevibus albis fulvisque parce vestitum, in parte apicali macula maxima olivacea vel fusca, antice posticeque attenuata, notatum, subtus testaceum, postice, prope mamillas, leviter infuscatum. Sternum, chelae pedesque obscure fulva, flavo-nitido parce pubescentia, tibiis anticis ad apicem metatarsisque valde infuscatis fere nigris, aculeis ordinariis. Vulva foveis binis obliquis carinaque media fulva, antice acuta, notata. -- Guiana et Brasilia sept.

35. **Erissus angulosus** sp. nov. — ♀ long. 6,5 mm. — Cephalothorax antice valde attenuatus, postice sat convexus et fere abrupte declivis, fusco-ravidus, parce nigro-punctatus et vitta fulva, in medio leviter constricta. postice, in declivitate, testacea et fusco-marginata, notatus, pilis robustis brevibus et obtusis, utrinque fulvis in medio albidis, aculeis nigris parvis parce intermixtis, vestitus. Oculi postici sat magni, fere aequi, inter se aequae et parum late distantes. Clypeus planus, area oculorum angustior. Abdomen latius quam longius, antice angustum et obtuse truncatum, postice valde dilatatum et subangulosum, cinereo-testaceum, antice oblique fusco-marginatum, pilis albidis obtusis en pronis, reticulum formantibus, parce vestitum. Sternum obscure fulvum. Pedes inter se valde inaequales, antici posticis multo longiores et crassiores, infuscati et parce nigro-punctati, femoribus aculeis brevibus sed robustis et leviter elevatis 6-7 munitis, tibiis aculeis inferioribus robustis nigris 6-6 et lateralibus minoribus utrinque 3, metatarsis aculeis inferioribus similibus 3-3 et lateralibus utrinque 3 valde armatis. Pedes postici luridi, fusco-annulati, nigro-aculeati et supra setis clavatis albidis paucis muniti. Vulvae fovea subrotunda, utrinque rufulo-marginata et carina angusta secta, notata. — Brasilia : Amazonas (Teffe).

36. **Pynaxis guttata** sp. nov. — ♀ (*pullus*) long. 4 mm. — Cephalothorax obscure fulvus, linea media, utrinque vitta lata dentata maculisque marginalibus parvis fuscis ornatus. Abdomen breve, nigrinum, maculis parvis testaceis subrotundis conspersum. Pedes obscure fulvo-olivacei, plus minus fusco-variati et subannulati, quatuor antici, femoribus exceptis, reliquis obscurioribus. — Manila!

37. **Onocolus pentagona** sp. nov. — ♀ (*pullus*) long. 5 mm. — Cephalothorax, pedes sternumque pallide lutea. Cephalothorax planus, postice haud elevatus, sublaevis, minutissime et parcissime rugosus. Oculi postici in lineam plane rectam. Abdomen multo latius quam longius, planum, transversim pentagonum, antice latissime et recte truncatum, utrinque oblique et brevius

truncatum, postice tuberculo medio subacuto munitum, supra fulvo-cervinum, fusco-reticulatum et impressionibus binis latis fuscis notatum, albido-marginatum, in lateribus et postice granulis paucis munitum, subtus albido-testaceum. Femora antica subtus, usque ad basin, serie dentium parvorum et inaequalium serrata. Tibiae subtus, in parte apicali, aculeis robustis fulvis subpellucetibus 3-3, metatarsi aculeis similibus 3-3 armati. Tibiae supra vix impressae. — Brasilia: Rio.

38. **Onocolus compactilis** sp. nov. — ♀ long. 7,5 mm. — Cephalothorax luteus, leviter fusco-variatus et postice plerumque binotatus, postice sat elevatus et abrupte declivis, subtiliter rugosus. Oculi postici in lineam leviter recurvam. Abdomen circiter aequum longum ac latum, antice obtuse truncatum, postice valde dilatatum et elevatum, rotundum vel obtuse angulosum et tuberculo magno et obtuso munitum, supra coriaceum, obscure fulvum, postice plus minus late fusco-variatus, subtus pallide testaceum, crasse et parce albo-pilosum. Sternum, chelae, pedesque pallide lurida, femoribus anticis ad apicem patellisque olivaceis. Femora antica subtus, usque ad basin, serie dentium parvorum et inaequalium serrata, tibiae subtus, prope apicem aculeis brevibus 2-2 armatae, metatarsi aculeis longioribus 3-3 muniti. Tibiae supra sat profunde impressae. — ♂ long. 3 mm. — Mas feminae valde dissimilis. Cephalothorax crassius, rugosus, fusco-coccineus, versus marginem sensim niger, vitta nigra lata postice abrupte angustiore notatus. Abdomen crebrius rugosum, postice minute trituberculatum, atrum, postice sensim dilutius et rufescens. Sternum et coxae obscure rufa. Pedes antiqui nigri, patellis metatarsisque ad basin dilutioribus, femoribus 2i parvis laete rufis, femoribus subtus dentibus parvis binis remotis tantum armatis. Pedes postici laete rufi, patellis tibiisque plus minus infuscatis. Pedes-maxillares atri, ad basin dilutiores; femore brevi subrecto; patella magna, antice obtusa; tibia patella duplo brevior, transversa, extus ad apicem apophysi valde bifida (ramulis duobus rectis acutis et divaricatis, inferiore superiore longiore); tarso lato, depresso disciformi, extus, prope basin, secundum apophyseum tibialem, profunde impresso. — Brasilia: Prov. Amazonas.

39. **Synalus terrosus** sp. nov. — ♀ long. 12,5 mm. — Fusco-opacus, pedibus posticis et tarsis cunctis paulo dilutioribus. Tegumenta valde coriacea, pilis brevibus lanceolatis pronis fulvis conspersa. Femora et tibiae antica vittis impressis glabris supra impressa. Tibiae posticae leviter angulosae. Femora 1i parvis intus, in parte basali valde convexa et aculeis

2 vel 3 munita, subtus aculeis numerosis biseriatis armata. Tibiae anticae subtus paululum depressae et aculeis longis et leviter elevatis 5-5, metatarsi aculeis similibus 4-4 (apicalibus reliquis minoribus) armati. Abdomen longissimum, parallelum, antice posticeque truncatum, cephalothorace plus duplo longius et plus triplo longius quam latius. Plagula vulvae plana, nigra, antice fovea parva semilunari impressa. — Tasmania.

40. **Gephyrina alba** sp. nov. — ♀ (*pullus*) long. 6 mm. — Albido-testacea, pilis pronis plumosis niveis crebre vestita, cephalothorace albo-opaco-marginato, abdomine longo, parallelo, antice minute emarginato, omnino albo-opaco. — Tibiae metatarsique quatuor antici subtus aculeis sat longis biseriatis instructi et, tantum extus, aculeis multo minoribus muniti. — Venezuela!

41. **Gephyra candida** sp. nov. — ♀ (*pullus*) long. 5 mm. — Albo-testacea, pilis pronis plumosis albo-sericeis dense vestita. Oculi quatuor antici in lineam parum recurvam, medii laterali-bus paulo majores et inter se quam ad laterales duplo remotiores. Oculi laterales postici anticis vix minores, prominuli. Oculi medii postici laterali-bus fere duplo minores et mediis anticis paulo minores. Tibiae metatarsique antici subtus aculeis longis gracilibus et pellucidibus, 2-2, instructi. — Saïgon!

42. **Ebo oblongus** sp. nov. — ♂♀ (*pulli*) long. 4,5 mm. — Cephalothorax non multo latior quam longior, pallide testaceus, utrinque fusco-olivaceus, parte cephalica postice macula albo-opaca, V magnum formante, notata, area oculorum albo-opaca. Oculi postici aequi, medii inter se quam a laterali-bus saltem $1/3$ remotiores, medii antici laterali-bus fere duplo majores. Clypeus verticalis, planus, area oculorum angustior. Abdomen oblongum, postice attenuatum, albido-testaceum, in parte basali vitta fusco-olivacea acute lanceolata, in parte altera vitta latiore, antice sensim evanescente, postice attenuata, in medio dilutiore, notatum. Sternum albo-opacum, albo-pilosum. Pedes-maxillares pedesque pallide luridi, tenuissime et creberrime fusco-irrorati, pedes cuncti parce aculeati. — Amer. sept. : Georgia.

43. **Hirrius variegatus** sp. nov. — ♀ long. 7,5 mm. — Cephalothorax fulvo-ravidus, niveo-pubescens, regione oculorum, clypeoque in medio albidis, parte thoracica dilutiore sed vitta submarginali fusco-reticulata notata. Abdomen pallide cinereum, transversim sinuoso-fusco-segmentatum, pilis plumosis albis, utrinque pilis rufulis mixtis, crebre vestitum. Sternum pedesque lurida, hi fusco-variati et subannulati. — Africa austr. : Transvaal!

44. **Suemus atomarius** sp. nov. — ♀ (*pullus*) long. 4 mm. — Cephalothorax abdomenque supra pilis pronis plumosis pallide flavidis vestita. Cephalothorax luridus, laevis, ad marginem crebre nigro-punctatus et minute granulosus. Abdomen fulvo-testaceum, ad marginem infuscatum et confuse segmentatum. Sternum pedesque pallide lurida, hi, in lateribus, creberrime nigro-punctatis. — Africa occid. : Sierra Leone.

DESCRIPTION DE COLÉOPTÈRES DE MADAGASCAR

ET ILES VOISINES

par **M. L. Fairmaire.**

Encya inermis. — Long. 27 mill. — Oblonga, postice leviter ampliata, convexa, picea, nitida, setulis adpressis pallide ferrugineis brevibus sat dense vestita; capite rugosulo-punctato, clypeo transversim carinato, antice late emarginato, antennarum clava quadrifoliata; prothorace transverso, antice angustato, dorso fortiter punctato, paulo rugosulo, margine laterali paulo crenulato; scutello brevi, fortiter punctato; elytris dense rugosulo-punctatis, sutura et utrinque costulis 2 parum elevatis, angulo suturali haud spinoso; subtus nitidior, pectore fere lævi, dense et sat longe ferrugineo-villoso, abdomine dense parum grosse punctato, sat dense pallido-ferrugineo setuloso, pedibus rugose punctatis. — Comores (Humboldt, coll. Oberthür et la mienne).

Ressemble beaucoup à l'*E. spinipennis*, de Madagascar, en diffère au premier coup d'œil par l'angle sutural inerme; le corps est plus court, moins fortement rugueux, la vestiture est formée de petites soies fines et non de courtes squamules, le pygidium et le dessous du corps ne sont pas blanchâtres, mais d'un ferrugineux clair.

Parachilia Legrosii. — Long. 22 mill. — Crassa, supra parum convexa, nigra, nitida; capite medio subtiliter, lateribus evidentius punctato et longitudinaliter paulo impresso, subtus longe barbato, clypeo fortiter emarginato; prothorace parum transverso, elytris angustiore, antice a medio angustato, lateribus sat crasse marginato, dorso lævi, lateribus subtiliter punctulato et medio foveola minuta signato, margine postico ad scutellum et utrinque leviter sinuato, angulis posticis obtuse rotundatis; scutello acuto, lævi; elytris ab humeris postice attenuatis, apice